
 <div>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL ROMA 1</div>	REGIONE LAZIO ASL ROMA 1 DIPARTIMENTO SVILUPPO ORGANIZZATIVO UOC SICUREZZA PREVENZIONE E RISK MANAGEMENT DIRETTORE:DOTT.SSA MADDALENA QUINTILI		 <div>REGIONE LAZIO</div>	
	PROTOCOLLI OPERATIVI DELLA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE NELLA ENDOSCOPIA DIGESTIVA		REV. 1 DEL 15.07.2020	PAG. 1 DI 1
			TAB_PG_SPRME_08_12	

Endoscopia Digestiva			Rischio trombotico		
			Basso Rischio	Rischio Intermedio	Alto Rischio
Rischio emorragico	Basso rischio	EGD o colonoscopia +/- biopsie, ecoendoscopie senza biopsie, polipectomie <1cm, ERCP, stent, dilatazione papilla senza sfinterotomia	ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: continuare	Chirurgia d'elezione: non controindicata ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: continuare	Chirurgia d'elezione: non controindicazioni ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: continuare
	Rischio Intermedio	Endoscopie +biopsia con ago sottile (FNA) per lesioni solide Dilatazioni di stenosi esofagee e colon-rettali Stent gastroenterici Trattamento con Argon plasma coagulation, polipectomie >1cm PEG Legatura/sclerosi varici Legatura/sclerosi emorroidi	ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico**	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico Bridge therapy con inibitori dei recettori GPIIb/IIIa**
	Alto rischio	Dilatazioni in acalasia Resezioni mucosa e submucosali Ampollectomia (Vater) Ecografia con biopsia (FNA) di cisti pancreatiche	ASA: sospendere Inibitori recettore P2Y₁₂: -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: ASA: sospendere Inibitori recettore P2Y₁₂: -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico** Bridge therapy con inibitori dei recettori GPIIb/IIIa**	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico Bridge therapy con inibitori dei recettori GPIIb/IIIa**
PEG percutaneous endoscopic gastrostomy; EGD esofago-gastro-duodenoscopia; ERCP colangio pancreatografia retrograda endoscopica; * 7 giorni per il prasugrel; ** discussione collegiale con i familiari e paziente.					