
 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL ROMA 1	REGIONE LAZIO ASL ROMA 1 DIPARTIMENTO SVILUPPO ORGANIZZATIVO UOC SICUREZZA PREVENZIONE E RISK MANAGEMENT DIRETTORE: DOTT.SSA MADDALENA QUINTILI		
	PROTOCOLLI OPERATIVI DELLA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE IN CHIRURGIA VASCOLARE		REV. 1 DEL 15.07.2020      PAG. 1 DI 1 TAB_PG_08_11

Chirurgia Vascolare			Rischio Trombotico		
			Basso rischio	rischio Intermedio	Alto rischio
Rischio emorragico	Basso rischio	Endoarteriectomia carotidea, bypass o endoarteriectomia periferiche, EVAR, TEVAR, amputazioni arti	<b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Considerare PTA o stenting Chirurgia d'elezione: non controindicata Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> continuare	Considerare PTA o stenting Chirurgia d'elezione: rinviare almeno 30 giorni dopo PCI Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> continuare
	rischio	Chirurgia open aorta addominale	<b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare o considerare EVAR Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> continuare	Chirurgia d'elezione: rinviare o considerare EVAR Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> continuare
	Alto rischio	Chirurgia toracica open e toracoaddominale	<b>ASA:</b> interrompere <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare o considerare EVAR Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> continuare	Chirurgia d'elezione: rinviare o considerare EVAR Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> continuare
L'uso di inibitori P2Y <sub>12</sub> è considerato in associazione con ASA; Nei pazienti in terapia con NOAC e candidati per stenting carotideo o PTA periferico o stenting la doppia antiaggregazione (e NOAC) dovrebbero essere continuata 1-3 mesi dopo la procedura; *7 giorni prima per il prasugrel; <b>PCI</b> percutaneous coronary intervention; <b>PTA</b> percutaneous transluminal angioplasty; <b>EVAR</b> endovascular repair for aortic aneurysm; <b>TEVAR</b> thoracic endovascular aortic/aneurysm repair					