
 <div>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL ROMA 1</div>	REGIONE LAZIO ASL ROMA 1 DIPARTIMENTO SVILUPPO ORGANIZZATIVO UOC SICUREZZA PREVENZIONE E RISK MANAGEMENT DIRETTORE:DOTT.SSA MADDALENA QUINTILI		 <div>REGIONE LAZIO</div>	
	PROTOCOLLI OPERATIVI DELLA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE NELLA CHIRURGIA ORTOPEDICA		REV. 1 DEL 15.07.2020	PAG. 1 DI 1
			TAB_PG_SPRM_08_08	

<b>Chirurgia Ortopedica</b>			<b>Rischio Trombotico</b>		
			<b>Basso rischio</b>	<b>rischio Intermedio</b>	<b>Alto rischio</b>
<b>Rischio emorragico</b>	<b>Basso rischio</b>	Chirurgia della mano Artroscopia di spalla e ginocchio Chirurgia minore della colonna vertebrale	<b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico**	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> continuare
	<b>rischio Intermedio</b>	Protesi di spalla Chirurgia maggiore della colonna vertebrale Chirurgia del ginocchio (legamento crociato anteriore, osteotomie) Chirurgia del piede	<b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico**	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico Bridge therapy con inibitori dei recettori GPIIb/IIIa**
	<b>Alto rischio</b>	Chirurgia protesica maggiore (anca e ginocchio) Traumatologia maggiore (bacino e ossa lunghe) Fratture di femore prossimale nell'anziano	<b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico**	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> -sospendere 5 giorni prima* <sup>°</sup> -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico Bridge therapy con inibitori dei recettori GPIIb/IIIa**
*7 giorni prima per il prasugrel; ** valutazione collegiale del rischio con i familiari e paziente; ° in caso di fratture di femore può essere indicato un approccio chirurgico rapido nonostante la doppia antiaggregazione senza aspettare la sospensione di 5 giorni.					