
 <div>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL ROMA 1</div>	REGIONE LAZIO ASL ROMA 1 DIPARTIMENTO SVILUPPO ORGANIZZATIVO UOC SICUREZZA PREVENZIONE E RISK MANAGEMENT DIRETTORE:DOTT.SSA MADDALENA QUINTILI		 <div>REGIONE LAZIO</div>		
	PROTOCOLLI OPERATIVI DELLA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE NELLA CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE		REV. 1 DEL 15.07.2020		PAG. 1 DI 1
			TAB_PG_SPRM_08_06		

Chirurgia Maxillofacciale			Rischio Trombotico		
			Basso rischio	rischio Intermedio	Alto rischio
Rischio emorragico	Basso rischio	Riduzione chiusa di fratture di arco zigomatico; riduzione chiusa di frattura di mandibola; lipofilling; artrocentesi e artroscopia dell'ATM; chirurgia dei tumori cutanei	<b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare  Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> continuare	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: <b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> continuare
	Intermedio rischio	Implantologia e chirurgia orale, riduzione chiusa di fratture di ossa nasali; riduzione aperta di fratture mandibola/mascellare; parotidectomia; chirurgia ortognatica; rianimazione dell' faccia in acuto e cronico	<b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare  Chirurgia non differibile: <b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico**	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico Bridge therapy con inibitori GPIIb/IIIa**
	Alto rischio	Chirurgia radicale ricostruttiva di tumori del distretto testa collo; riduzione aperta di fratture orbito zigomatiche; scialoadenectomia sottomandibolare	<b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare  Chirurgia non differibile: <b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico**	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico Bridge therapy con inibitori GPIIb/IIIa**

\*7 giorni prima per il prasugrel; \*\* valutazione collegiale del rischio con i familiari e paziente.