
 <div>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL ROMA 1</div>	REGIONE LAZIO ASL ROMA 1 DIPARTIMENTO SVILUPPO ORGANIZZATIVO UOC SICUREZZA PREVENZIONE E RISK MANAGEMENT DIRETTORE:DOTT.SSA MADDALENA QUINTILI				
	PROTOCOLLI OPERATIVI DELLA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE IN CHIRURGIA UROLOGICA			Rev.1 del 15.07.2020	PAG. <b>1</b> DI <b>1</b>
				TAB PG SPRM 08 02	

<b>Chirurgia Urologica</b>			<b>Rischio Trombotico</b>		
			<b>Basso rischio</b>	<b>rischio Intermedio</b>	<b>Alto rischio</b>
<b>Rischio emorragico</b>	<b>Basso rischio</b>	Cistoscopia flessibile cateterizzazioni ureterali ureteroscopia	<b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	<b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> continuare	<b>ASA:</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> continuare
	<b>rischio Intermedio</b>	Biopsia prostatica, circoncisione, orchiectomia	<b>ASA:</b> sospendere <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore**, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore**, con dose carico considera bridge therapy con inibitori dei recettori GPIIb/IIIa**
	<b>Alto rischio</b>	Nefrectomia radicale e parziali, nefrotomia percutanea, litotrissia percutanea, cistectomia e prostatectomia radicale, TURP, TURBT, resezioni peniene, orchiectomia parziale	<b>ASA:</b> sospendere <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> sospendere, <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub>:</b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72** ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: <b>ASA</b> continuare <b>Inibitori recettore P2Y<sub>12</sub></b> -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore**, con dose carico considera bridge therapy con inibitori dei recettori GPIIb/IIIa**
L'uso degli inibitori P2Y <sub>12</sub> è considerato con ASA. *7 giorni prima per il prasugrel; ** valutazione collegiale del rischio anche con i familiari e paziente; <b>TURP</b> transurethral resection of prostate; <b>TURBT</b> transurethral resection of bladder tumour					