
 <div>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL ROMA 1</div>	REGIONE LAZIO ASL ROMA 1 DIPARTIMENTO SVILUPPO ORGANIZZATIVO UOC SICUREZZA PREVENZIONE E RISK MANAGEMENT DIRETTORE:DOTT.SSA MADDALENA QUINTILI			
	PROTOCOLLI OPERATIVI DELLA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE IN CHIRURGIA GENERALE			REV. 1 DEL 15.07.2020
			TAB PG 08/1	

Chirurgia Generale			Rischio Trombotico		
			Basso rischio	rischio Intermedio	Alto rischio
Rischio emorragico	Basso rischio	Ernioplastica, laparocoele, colecistectomia, appendicectomia, colectomia, resezioni gastriche e intestinali, chirurgia mammaria	ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: continuare	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: continuare
	rischio Intermedio	Emorroidectomia, splenectomia, gastrectomia, chirurgia bariatrica, resezioni rettali, tiroidectomia	ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico**	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore**, con dose carico Bridge therapy con inibitori dei recettori GPIIb/IIIa**
	Alto rischio	Resezioni epatiche, duodenocefalo pancreasectomia	ASA: interrompere Inibitori recettore P2Y₁₂: -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore, con dose carico**	Chirurgia d'elezione: rinviare Chirurgia non differibile: ASA: continuare Inibitori recettore P2Y₁₂: -sospendere 5 giorni prima* -risomministrare entro 24-72 ore**, con dose carico Bridge therapy con inibitori dei recettori GPIIb/IIIa**
L'uso degli inibitori P2Y ₁₂ è considerato in associazione con ASA; *7 giorni prima per il prasugrel; ** valutazione collegiale del rischio anche con i familiari e paziente.					