

## PROCEDURA FARMACOLOGICA IN DH - DOPO LA DIMISSIONE

### Nella prima settimana:

- non usare assorbenti interni
- non fare lavande vaginali interne
- non avere rapporti sessuali
- non fare il bagno (fare la doccia)

### SONO NORMALI:

- **perdite di sangue** simili a mestruazioni abbondanti, che durano in media 9-10 giorni; se fossero molto abbondanti (si riempiono più di 2 assorbenti maxi in 1 ora per due ore consecutive o più di 4 assorbenti maxi in 2 ore) si deve tornare in ospedale per un controllo
- **febbre** attorno a 37-37,5°C; se la febbre supera i 38°C e non passa con i comuni antipiretici (paracetamolo-tachipirina) si deve tornare in ospedale per un controllo
- **dolori simili a crampi mestruali**; se dovessero diventare sempre più acuti e non dovessero passare con i comuni antidolorifici (paracetamolo o ibuprofene) si deve tornare in ospedale per un controllo

### NON SONO NORMALI e ci si deve recare in pronto soccorso:

- **emorragie** (si riempiono più di 2 assorbenti maxi in 1 ora per due ore consecutive o più di 4 assorbenti maxi in 2 ore)
- **febbre superiore a 38°C** che non va via con i comuni antipiretici
- **dolore intenso che non va via** con i comuni antidolorifici, anzi tende a peggiorare
- **sensazione di malessere che peggiora progressivamente, brividi, nausea, vomito**

Per ulteriori informazioni contattare il servizio IVG tel: .....

Può comunque recarsi presso il Pronto Soccorso ostetrico-ginecologico dell'ospedale di riferimento ..... a qualsiasi ora

Esegua un controllo per le betaHCG il giorno .....

Il risultato sarà sicuramente positivo, a volte molto alto. Non si preoccupi, ma invii il risultato a:

.....

I medici le diranno se la procedura è conclusa, o se dovrà tornare in ospedale per un controllo clinico o ecografico