


GRAM POSITIVI																									
Batteri rilevati più spesso in caso di coltura positiva (con antibiogramma effettuato)	Percentuale di microrganismi SENSIBILI (a dosi terapeutiche STANDARD O AUMENTATE, criteri EUCAST)																								
	Ac.Fusidic	Amoxicillin	Amox.Clav	Ampicillin	Ampic.Sull	Ciprofloxa	Clindamic	Cotrimoxa	Daptomic	Eritromcin	Gentamic	Imipenem	Levofloxa	Linezolid	Moxifloxa	Mupirocina	Nitrofurant	Oxacillin	Penicillin	Rifampicin	Teicoplan	Tetracicl	Tigeciclin	Vancomic	
• Enterococcus faecalis (n.715)	nd	nd	100	100	100	84	nd	nd	nd	nd	77 (*)	100	83	100	nd	nd	99	nd	nd	nd	100	nd	100	100	
• Staphylococcus aureus (n.365)	93	nd	nd	nd	nd	nd	62	99	100	58	90	nd	76	100	nd	100	nd	80	24	96	100	96	100	100	
• Streptococcus agalactiae (n.321)	nd	100	100	nd	nd	nd	84	99	nd	65	nd	nd	95	100	96	nd	nd	nd	100	81	100	27	100	100	
• Streptococcus pyogenes (BETA-emolit. gruppo A) (n.49)	nd	100	100	nd	nd	nd	86	96	nd	75	nd	nd	86	100	89	nd	nd	nd	100	96	100	75	100	100	
• Enterococcus faecium (n.38)	nd	nd	nd	13	nd	9	nd	nd	nd	nd	29 (*)	10	9	100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	60	nd	100	60	
• Aerococcus urinae (n.40)	nd	nd	nd	100	nd	90	nd	nd	nd	nd	nd	nd	89	nd	nd	nd	97	nd	100	nd	nd	nd	nd	100	
• Staphylococcus saprophyticus (n.36)	0	nd	nd	nd	nd	nd	94	100	100	69	100	nd	100	100	nd	nd	nd	100	nd	100	100	97	100	100	

GRAM NEGATIVI		Percentuale di microrganismi SENSIBILI (a dosi terapeutiche STANDARD O AUMENTATE, criteri EUCAST)																						
Batteri rilevati più spesso in caso di coltura positiva (con antibiogramma effettuato)		Amikacina	Amox.Clav	Ampicillina	Azitromic	Cefalexina	Cefepime	Cefixima	Cefotaxim	Cefpodoxil	Ceftazidim	Ceftriaxol	Ciprofloxa	Colistina	Cotrimoxa	Eritromicin	Ertapenem	Gentamic	Levofloxa	Meropenem	Nitrofurant	Pip.tazob	Tetracicl	
• Escherichia coli (n.4584)		100	74	50	nd	80	88	80	83	80	85	83	68	100	74	nd	100	88	70	100	99	91	nd	
• Klebsiella spp. (n.1169)		100	76	0	nd	77	55	79	58	78	80	80	78	100	84	nd	92	88	82	92	nd	58	nd	
• Proteus spp. (n.553)		nd	72	50	nd	nd	89	85	68	78	87	78	58	nd	62	nd	100	81	61	100	nd	97	nd	
• Pseudomonas aeruginosa (n.316)		98	nd	nd	nd	nd	89	nd	nd	nd	89	nd	77	100	nd	nd	nd	nd	79	96	nd	81	nd	
• Citrobacter spp. (n.282)		100	85	nd	nd	79	nd	88	95	79	94	93	97	nd	98	nd	100	99	98	100	nd	nd	nd	
• Enterobacter spp. (n.152)		100	0	nd	nd	0	nd	48	79	48	79	76	97	nd	96	nd	99	99	98	100	nd	nd	nd	
• Morganella spp. (n.102)		nd	1	0	nd	0	nd	64	74	66	81	91	79	nd	79	nd	100	96	83	100	nd	nd	nd	
• Providencia spp. (n.42)		nd	0	0	nd	0	nd	87	nd	74	75	73	36	nd	57	nd	100	48	32	100	nd	nd	nd	
• Haemophilus spp. (n.40)		nd	100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	100	92	nd	90	nd	nd	nd	nd	100	nd	nd	97	
• Campylobacter spp. (n.32)		nd	nd	nd	100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	22	nd	nd	100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	48	

Campioni ambulatoriali sottoposti a esame microbiologico (colturale)



ANTIBIOGRAMMA CUMULATIVO PAZIENTI ESTERNI 2025

NOTE:
- nd = antibiotico non testato, o dato non valido per ragioni tecniche, indicazioni EUCAST, oppure ridotta numerosità dei casi
- (*) Gentamicina alta concentrazione
- il colore nella cella dell'antibiotico corrisponde allo schema AWaRe WHO: verde = Access; giallo = Watch; rosso = Reserve



patogeni batterici e fungini più frequenti (virus non valutati in questa tabella)			
emocolture	-	-	-
essudati e mat.vie genit. Gardnerella vaginalis	Candida albicans	Micoplasmi urogenitali	Streptococcus agalactiae (beta emol. gr.B)
feci	Campylobacter spp.	Clostridioides difficile	Yersinia spp.
cute e annessi	Dermatofiti (varie specie)	-	-
secrezioni ferita	Staphylococcus aureus	Pseudomonas aeruginosa	Proteus mirabilis
secrezioni bronchiali	Pseudomonas aeruginosa	Haemophilus influenzae	Streptococcus pneumoniae
tamponi faringei	Streptococcus pyogenes (beta emol. gr.A)	Streptococchi beta emolitici gr.C,G	-
urine	Escherichia coli	Klebsiella pneumoniae	Enterococcus faecalis
liquido seminale	Enterococcus faecalis	Gardnerella vaginalis	Micoplasmi urogenitali