

GRAM POSITIVI																										
Microorganismi implicati nei principali tipi di infezione batterica, nella ASL Roma 1	Percentuale di microorganismi SENSIBILI (a dosi terapeutiche STANDARD O AUMENTATE, criteri EUCAST)																									
	Ac.Fusid	Amoxic.	Amox.C	Ampicill	Ceftarol	Ceftriax	Ciproflo	Clindam	Cotrimox	Daptom	Eritrom	Gentam	Imipene	Levoflo	Linezoli	Mupiroc	Nitrofur	Oxacilli	Penicilli	Rifampin	Teicoplan	Tetracicl	Tigecicl	Vancom		
• Staphylococcus aureus (n.241)	95	nd	nd	nd	100	nd	nd	57	99	100	54	88	nd	64	100	97	nd	62	20	98	100	95	100	100		
• Enterococcus faecalis (n.138)	nd	nd	100	100	nd	nd	68	nd	nd	nd	nd	62 (*)	100	67	100	nd	99	nd	nd	nd	96	nd	100	96		
• Staphyloc. epidermidis (n.114)	74	nd	nd	nd	nd	nd	nd	68	85	100	26	41	nd	46	89	nd	nd	22	nd	75	nd	51	100	100		
• Enterococcus faecium (n.91)	nd	nd	nd	11	nd	nd	7	nd	nd	nd	nd	39 (*)	11	8	100	nd	nd	nd	nd	nd	65	nd	100	65		
• Staphyloc. haemolyticus (n.34)	53	nd	nd	nd	nd	nd	nd	44	35	100	6	21	nd	21	100	nd	nd	21	nd	41	68	23	100	100		
• Streptococcus pneumoniae (n.20)	nd	100	95	100	nd	100	nd	37	90	nd	20	nd	nd	85	100	nd	nd	nd	100	100	100	35	nd	100		

GRAM NEGATIVI																							
Microorganismi implicati nei principali tipi di infezione batterica, nella ASL Roma 1	Percentuale di microorganismi SENSIBILI (a dosi terapeutiche STANDARD O AUMENTATE, criteri EUCAST)																						
	Amikaci	Amox.C	Cefepim	Cefotax	Ceftazi	Ceftaz-Avibac	Ceftol-Tazoba	Ciproflo	Clindam	Colistin	Cotrimo	Ertaper	Gentam	Imp.-Releba	Levoflo	Merope	Merop.-Vaporb	Metroni	Nitrofu	Pip.Taz	Tigecic		
• Escherichia coli (n.509)	99	65	79	67	74	99	95	63	nd	100	68	99	84	100	64	99	99	nd	100	85	100		
• Klebsiella spp. (n.289)	98	60	68	68	65	94	66	65	nd	99	73	87	83	92	72	78	93	nd	nd	59	nd		
• Pseudomonas aeruginosa (n.211)	97	nd	96	nd	85	94	95	77	nd	100	nd	nd	nd	95	84	89	88	nd	nd	69	nd		
• Proteus spp. (n.117)	nd	67	83	67	80	97	91	54	nd	0	54	99	79	nd	57	97	97	nd	nd	96	nd		
• Acinetobacter spp. (n.45)	22	nd	nd	nd	nd	nd	nd	9	nd	98	nd	nd	20	nd	nd	9	nd	nd	nd	nd	nd		
• Enterobacter spp. (n.84)	100	0	92	39	68	100	79	95	nd	95	95	93	97	100	100	99	100	nd	nd	66	nd		
• Citrobacter (n.39)	97	81	100	81	92	100	100	97	nd	100	96	100	97	100	95	100	100	nd	nd	87	100		
• Bacteroides spp. (n.56)	nd	77	nd	nd	nd	nd	nd	nd	77	nd	nd	nd	nd	nd	nd	100	nd	100	nd	53	nd		

MICETI (lieviti)						ANTIBIOGRAMMA CUMULATIVO paz. interni																
Microorganismi implicati nei principali tipi di infezione fungina, nella ASL Roma 1		% SENSIBILI (criteri EUCAST)				NOTE: - nd = antibiotico non testato, o dato non valido per ragioni tecniche - (*) Gentamicina alta concentrazione - per la Candida sono stati valutati solo gli isolati sistemici; la resistenza agli azoli è stata osservata in un solo caso degli n.8 di Candida NON-albicans - il colore nella cella dell'antibiotico corrisponde allo schema AWARe WHO: verde = Access; giallo = Watch; rosso = Reserve BASATO SUI DATI 2025																
		Amfote	Caspof	Flucon	Voricon																	
• Candida albicans (n.15)		100	100	100	100																	
• Candida, altre specie (n.8)		nd	nd	nd	nd																	

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1

REGIONE
LAZIO

ANTIBIOGRAMMA CUMULATIVO paz. interni

NOTE:

- nd = antibiotico non testato, o dato non valido per ragioni tecniche
- (*) Gentamicina alta concentrazione
- per la Candida sono stati valutati solo gli isolati sistemici; la resistenza agli azoli è stata osservata in un solo caso degli n.8 di Candida NON-albicans
- il colore nella cella dell'antibiotico corrisponde allo schema AWaRe WHO: verde = Access; giallo = Watch; rosso = Reserve

BASATO SUI DATI 2025

